



Start BLS 30:2

Bij arriveren reanimatieteam zo snel mogelijk aansluiten aan de defibrillator met de defi-pads en opladen met 150-200 Joules

Tijdens opladen worden thoraxcompressies gecontinueerd!

CONTROLEER OUTPUT ALS JE OUTPUT KUNT VERWACHTEN

1

Ritmecheck

PEA/Asystolie

Dump de lading

- 2 minuten BLS
- Zorg voor IV of IO toegang
- **1 mg adrenaline iv/io**

Tijdens reanimatie

- Borstcompressies 5-6 cm diep
- Frequentie 100-120/min
- Max 5 sec onderbreking van de borstcompressies
- Beadem max 10-12/min
- Corrigeer reversibele oorzaken

2

Ritmecheck

PEA/Asystolie

Dump de lading

- 2 minuten BLS
- Overweeg intubatie
- Start doorlopen 4xH 4xT

Reversibele oorzaken

4xH

- Hypoxie
- Hypovolemie
- Hypo/hyperkaliëmie (elektrolytenstoornissen)
- Hypothermie

3

Ritmecheck

PEA/Asystolie

Dump de lading

- 2 minuten BLS
- **1mg adrenaline iv/io**
- Doorlopen rest 4 x H 4 x T

4xT

- Trombo-embolisch proces
- Tamponade
- Toxinen
- Tension pneumothorax

4

Ritmecheck

PEA/Asystolie

Dump de lading

- 2 minuten BLS
- Samenvatten

Postreanimatiezorg

- ABCDE benadering
- Optimalisering oxygenatie en ventilatie
- 12-afleidingen ECG
- Kies vervolgtraject
- Therapeutische hypothermie
- Behandel onderliggende zaken

5

Ritmecheck

PEA/Asystolie

Dump de lading

- 2 minuten BLS
- **1 mg adrenaline iv/io**



Start BLS 30:2

Bij arriveren reanimatieteam zo snel mogelijk aansluiten aan de defibrillator met de defi-pads en opladen met 150-200 Joules

Tijdens opladen worden thoraxcompressies gecontinueerd!

1



Ritmecheck

VF of polsloze VT

1x 150-200 Joules

- 2 minuten BLS
- Zorg voor IV of IO toegang

Tijdens reanimatie

- Borstcompressies 5-6 cm diep
- Frequentie 100-120/min
- Max 5 sec onderbreking van de borstcompressies
- Beadem max 10-12/min
- Corrigeer reversibele oorzaken

2



Ritmecheck

VF of polsloze VT

1x max Joules

- 2 minuten BLS
- Overweeg intubatie
- Start doorlopen 4xH 4xT

Reversibele oorzaken

4xH

- Hypoxie
- Hypovolemie
- Hypo/hyperkaliëmie (elektrolytenstoornissen)
- Hypothermie

3



Ritmecheck

VF of polsloze VT

1x max Joules

- 2 minuten BLS
- **1 mg adrenaline + 300 mg amiodaron iv/io**
- Doorlopen 4xH 4xT

4xT

- Trombo-embolisch proces
- Tamponade
- Toxinen
- Tension pneumothorax

4



Ritmecheck

VF of polsloze VT

1x max Joules

- 2 minuten BLS
- Samenvatten

Postreanimatiezorg

- ABCDE benadering
- Optimalisering oxygenatie en ventilatie
- 12-afleidingen ECG
- Kies vervolgtraject
- Therapeutische hypothermie
- Behandel onderliggende oorzaken

5



Ritmecheck

VF of polsloze VT

1x max Joules

- 2 minuten BLS
- **1 mg adrenaline + 150 mg amiodaron iv/io**