

Reden voor maximaal zuurstof zoals bij CO-/cyanide intoxicatie of een reanimatiebehoefte patiënt?

Ja

**NRM 12-15L O<sub>2</sub>**

Nee

Indicatie restrictief \* O<sub>2</sub>-beleid?

Ja

Zet de patiënt recht op tenzij contra-indicaties

Ja

Nee

Nee

O<sub>2</sub> Sat <88%

Nee

Geef geen O<sub>2</sub>

O<sub>2</sub> Sat <85%

O<sub>2</sub> Sat 85%-94%

O<sub>2</sub> Sat >94%

Ja

Start **neusbriil 1-5L O<sub>2</sub>** of **zuurstofmasker 5-10L O<sub>2</sub>**

Titreer O<sub>2</sub> Sat 88-92%

Vernevelen zo nodig

Start **NRM 12-15L O<sub>2</sub>** of **zuurstofmasker 5-10L O<sub>2</sub>** of **neusbriil 1-5L O<sub>2</sub>**

Titreer O<sub>2</sub> Sat 94-98%

Vernevelen zo nodig

Start **neusbriil 1-5L O<sub>2</sub>** of **zuurstofmasker 5-10L O<sub>2</sub>**

Titreer O<sub>2</sub> Sat 94-98%

Vernevelen zo nodig

Geef geen zuurstof

Vernevelen zo nodig

\*

COPD GOLD III-IV die risico lopen op hypercapnisch falen  
 Chronische neuro-musculaire aandoeningen (ernstige ALS)  
 Morbide adipositas met een BMI >40  
 Ernstige borstwandziekte zoals ernstige pectus excavatum  
 Ernstige kyfo-scoliose  
 Taaislijmziekte  
 Bronchiectasiën

**Oranje** vooral in ziekenhuizen en pre hospitaal gebruikt, incidenteel door de huisarts.

**Groen** vooral in verpleeghuizen en ziekenhuizen gebruikt, incidenteel door de 1e lijn.

**Blauw** wordt vrijwel overal gebruikt, zowel in de 1e als in de 2e lijn en pre hospitaal.